


การดูแลหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19

หลังฉีดวัคซีนแล้ว คุณจะได้รับการแนะนำให้พักรออยู่ที่คลินิกบริการฉีดวัคซีนประมาณ 15-30 นาที เพื่อให้มั่นใจว่าคุณไม่มีอาการแพ้ อาการแพ้เกิดขึ้นได้น้อยมาก เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนรู้วิธีรักษาอาการแพ้

ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ ให้ทราบหากคุณสังเกตเห็นผื่นขึ้นตามผิวหนัง รู้สึกบวมที่ใบหน้าหรือที่ปาก รู้สึกหายใจติดขัด และ/หรือคุณรู้สึกไม่สบายขณะนั้น

คุณอาจมีอาการข้างเคียงเล็กน้อยหลังจากได้รับวัคซีน มักจะหายได้เองใน 2-3 วัน อาการข้างเคียงที่พบได้บ่อย เช่น

- ปวด บวม มีผื่นแดงบริเวณจุดที่ฉีด
- อ่อนเพลีย
- ปวดหัว
- ปวดกล้ามเนื้อหรือปวดข้อ
- มีไข้ต่ำๆ หนาวสั่น
- ต่อม้ำเหลืองบวม (พบน้อย)
- ท้องเสีย
- คลื่นไส้หรืออาเจียน



ผลข้างเคียงรุนแรงหลังการฉีดวัคซีนเกิดขึ้นได้น้อยมาก อย่างไรก็ตาม หากมีอาการแพ้รุนแรงใดๆ ก็ตามภายในสามวันหลังฉีดวัคซีนแล้ว ต้องติดต่อขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที โทรแจ้ง 9-1-1 หากมีอาการป่วยรุนแรง

อาการแพ้ที่รุนแรง รวมถึง:

- ผื่นขึ้นทั้งตัว
- อาการบวมที่ใบหน้าหรือที่ปาก
- หายใจลำบาก
- มีไข้สูง (มีไข้สูงเกิน 40 องศาเซลเซียส)
- มีอาการชักรกระดูกหรือตัวเกร็ง
- ผิวซีดเหลืองขึ้นและมีภาวะง่วงนอนมากผิดปกติ
- มีอาการแพ้รุนแรงอย่างอื่น (อย่างเช่น คล้ายๆ กับมีเข็มหมุดจิ้มตามร่างกายหรืออาการชาตามจุดต่างๆ ในร่างกาย)

ในกรณีฉุกเฉินโทรแจ้ง 9-1-1: สามารถโทรจากโทรศัพท์เครื่องใดก็ได้ หากคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ให้บอกชื่อภาษาที่คุณต้องการ (เช่น “ไทย”)

ข้อมูลนี้จัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุขของออนแทรีโอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาได้ที่ ontario.ca/covidvaccine